

МНЕНИЕ О ПРИЕМЕ МАОЛО

Д-ра Деяна Николова Давидова
Начальник отделения химиотерапии
УМБАЛ им. Д-ра Г. Странского – Плевен – ЕАД

Касательно приема МАОЛО – капсулы.

Прием медикамента МАОЛО – капсулы проводили на Отделении Химиотерапии, УМБАЛ – им. Д-ра Г. Странского – Плевен – ЕАД в течение одного года с октября 2009 года по сентябрь 2010 года. Наблюдали десять больных с разными злокачественными заболеваниями в сильно развитой форме или на метастазированном этапе в условиях применения химиотерапии. Распределение больных по диагнозам следующее:

- 1) С карциномой матки шейки – 4
- 2) С карциномой молочной железы – 3
- 3) С карциномой желудочно-кишечного тракта – 1
- 4) С карциномой легких – 2

У всех больных в качестве эффекта проведенной химиотерапии мы наблюдали лейкопению легкой или средней степени по шкале СЗО. Этим больным предписали лечение МАОЛО – капсулами в дозе 3 раза по одной в день, в течение десяти дней. В результате применения терапии установили восстановление числа лейкоцитов до нормы после 5-10 дней лечения, что позволило нам продолжить запланированную цитостатическую терапию. Приостанавливать химиотерапию не довелось ни в одном из случаев. Не констатировали значимых побочных эффектов. У одного из пациентов появилась тошнота второй степени, которую купировали, применяя антиэметик, а прием МАОЛО продолжили.

В целом мы считаем, что МАОЛО имело свое влияние в процессе лечения лейкопении у пациентов, проходящих химиотерапию. Лечение не вызывало неприятностей у пациента, мы не установили сигнификантных побочных эффектов. Прием МАОЛО позволяет осуществлять запланированные курсы химиотерапии.

г. Плевен, 14.02.2011 года

(д-р Д. Давидов, начальник отделения), (подпись)

Печать (Онкологический центр, УМБАЛ им. д-ра Георгия Странского, ЕАД, Плевен)

ПРИМЕЧАНИЕ: С оригиналом документа на болгарском языке Вы можете ознакомиться на странице сайта www.smilo-bg.com