

КОМПЛЕКСНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

г. Русе, ул. Независимость № 2

МНЕНИЕ О ПРИЕМЕ МАОЛО

Д-ра Ивана Иванова

Начальник Отделения медицинской онкологии Комплексного онкологического центра – ЕООД – Русе

Касательно полученных результатов состоявшегося клинического наблюдения за действием МАОЛО во время химиотерапии.

Настоящий опыт имеет своей целью исследование воздействия пищевой добавки МАОЛО на пациентов во время химиотерапии и его эффективности.

В клиническом наблюдении участвовали 22 госпитализированных и амбулаторных пациента, оно было осуществлено в ОМО и в кабинете медицинской онкологии КОЦ-Русе-ЕООД в период 10.08.2009 – 30.12.2010 года. Добавку назначали в случаях легкой и умеренно тяжелой лейкопении у пациентов, у которых установлены следующие диагнозы:

- 1) Карцинома молочной железы – 7
- 2) Карцинома шейки матки – 8
- 3) Карцинома толстой кишки -6

Исходное число лейкоцитов варьировало между 1.7 и 2.9 G/L, когда мы назначили прием МАОЛО два раза в день по 1 капсуле. Стали следить за результатами картины крови в течение 5-7 дней. Установили увеличение лейкоцитов выше 3.5 G/L. В случаях, когда прием длился еще неделю, по две капсулы в день, число лейкоцитов повысилось до 6 G/L. В промежуточное время курсов химиотерапии (переливание химиотерапевтиков) МАОЛО принимали по 1 или 2 капсулы в день, в зависимости от числа лейкоцитов, а также и до конца химиотерапевтического лечения.

Мы обнаружили стабилизирование и увеличение числа гемоглобина и тромбоцитов.

Благодаря этому пациенты, которые принимали МАОЛО, закончили курс химиотерапии без перерыва из-за лейкоцитопении.

Накопленный клинический опыт позволил нам применять МАОЛО и в случаях госпитализации и в случаях амбулаторного лечения пациентов.

Наблюдение за числом лейкоцитов при амбулаторных пациентах раз в неделю вскрыло положительную тенденцию их стабилизации выше 3.5 G/L при исходных данных 1.7 и 2.8 G/L. Лейкоциты стали нормализовать свое количество, а в определенных случаях достигли 6 G/L.

Пациенты, принимающие МАОЛО во время химиотерапевтических процедур в течение 2-4 недели, не сообщали о побочных эффектах. Наше заключение к данному моменту состоит в том, что МАОЛО может поддерживать статус здоровья больного и может оказывать благоприятное влияние различным структурам и функциям организма, кроветворной функции и в особенности лейкопозу. Благоприятствует эффективной лейкостимуляции в случаях легкой и умеренно тяжелой лейкопении, возникшей в результате химиотерапии. Воздействие МАОЛО переносится больными положительным образом без установления побочных и нежеланных реакций.

Образцы МАОЛО нам предоставила Агенция качества и безопасности товаров „СМИЛО”, г. София

г. Русе

24. 01. 2011 г.

Д-р Иван Иванов

Медицинский онколог КОЦ-РУСЕ-ЕООД

(подпись)

(печать: д-р ИВАН ИВАНОВ)

ПРИМЕЧАНИЕ: С оригиналом документа на болгарском языке Вы можете ознакомиться на странице сайта www.smilo-bg.com